

# VACUNAS RECOMENDADAS EN 2016 PARA LACTANTES, NIÑOS Y ADOLESCENTES

|             | Gripe                           | Tdap/DTaP                            | Antineumocócica     | MMR   | VPH                              | Viruela loca    | Hepatitis A                                 | Hepatitis B          | Hib                            | RV               | IPV                                  | Antimeningocócica |  |                      |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|-----------------|---|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|--|----------------------|
|             | <i>Influenza</i>                | <i>Tétanos, difteria, tos ferina</i> | <i>PCV</i>          | <i>Sarampión, paperas, rubéola</i>          | <i>Virus del papiloma humano</i> | <i>Varicela</i> |   |                      | <i>Gripe hemofílica tipo b</i> | <i>Rotavirus</i> | <i>Antipoliomielítica inactivada</i> | <i>MenACWY</i>    | <i>MenB</i>  |                      |
| Nacimiento  |                                 |                                      |                     |   |                                  |                 |   | Dosis 1              |                                |                  |                                      |                   |  |                      |
| 1 mes       |                                 |                                      |                     |   |                                  |                 |   | Dosis 2              |                                |                  |                                      |                   |  |                      |
| 2 meses     |                                 | Dosis 1 de DTaP                      | Dosis 1             |   |                                  |                 |   |                      | Dosis 1                        | Dosis 1          | Dosis 1                              |                   |  |                      |
| 4 meses     |                                 | Dosis 2 de DTaP                      | Dosis 2             |   |                                  |                 |   |                      | Dosis 2                        | Dosis 2          | Dosis 2                              |                   |  |                      |
| 6 meses     | Gripe (anualmente) <sup>1</sup> | Dosis 3 de DTaP                      | Dosis 3             |   |                                  |                 |   |                      | Dosis 3                        | Dosis 3          |                                      |                   |  |                      |
| 12 meses    |                                 |                                      | Dosis final         | Dosis 1                                     |                                  | Dosis 1         |   | Dosis 3              | Dosis final                    |                  | Dosis 3                              |                   |  |                      |
| 15 meses    |                                 | Dosis 4 de DTaP                      |                     |   |                                  |                 |   | 2 dosis <sup>3</sup> |                                |                  |                                      |                   |  |                      |
| 18 meses    |                                 |                                      |                     |   |                                  |                 |   |                      |                                |                  |                                      |                   |  |                      |
| 19-23 meses |                                 |                                      |                     |   |                                  |                 |   |                      |                                |                  |                                      |                   |  |                      |
| 2-3 años    |                                 |                                      |                     |   |                                  |                 |   |                      |                                |                  |                                      |                   |  |                      |
| 4-6 años    |                                 |                                      | Dosis final de DTaP |   | Dosis final                      |                 | Dosis final                                 |                      |                                |                  |                                      | Dosis final       |  |                      |
| 7-8 años    |                                 |                                      |                     | Recomendada para ciertas afecciones médicas |                                  |                 |   |                      |                                |                  |                                      |                   | Recomendada para ciertas afecciones médicas          |                      |
| 9-10 años   |                                 |                                      |                     |   |                                  |                 | 3 dosis <sup>2</sup>                        |                      |                                |                  |                                      |                   |  |                      |
| 11-12 años  |                                 |                                      | 1 dosis de Tdap     |   |                                  |                 |   |                      |                                |                  |                                      |                   |  | Dosis 1 <sup>4</sup> |
| 13-15 años  |                                 |                                      |                     |   |                                  |                 | Recomendada para ciertas afecciones médicas |                      |                                |                  |                                      |                   | Recomendada para ciertas afecciones médicas          |                      |
| 16-18 años  |                                 |                                      |                     |   |                                  |                 |   |                      |                                |                  |                                      | Dosis final       | Los adolescentes entre 16 y 18 años pueden vacunarse |                      |

**Verde azulado:** Las casillas sombreadas con este color indican que la vacuna se recomienda para todos los niños, excepto que el médico le diga que su hijo no puede recibir la vacuna de manera segura.

**Amarillo:** Las casillas sombreadas con este color indican que la vacuna se puede aplicar en el rango de edad especificado.

**Naranja:** Las casillas sombreadas con este color indican que la vacuna se recomienda para niños con ciertas afecciones médicas que los ponen en riesgo de padecer enfermedades graves. Tenga en cuenta que los niños sanos pueden recibir la serie de Hepatitis A.

**Verde:** La casilla sombreada con este color indica que la vacuna se recomienda para niños que no presenten un riesgo mayor, pero que deseen vacunarse después de hablar con un proveedor de atención médica.

---

Nota: Si su hijo no recibió una vacuna, no es necesario que empiece de cero. Hable con su médico para averiguar cuáles son las opciones. Puede ver los cronogramas de vacunación detallados de los Centros para el Control de Enfermedades (Centers for Disease Control, CDC) [aquí](#).

### Notas al pie de página:

<sup>1</sup> Todas las personas que tengan 6 meses de edad o más, incluidos los preadolescentes y adolescentes, deben vacunarse contra la gripe todos los años. Es posible que los niños que tienen menos de 9 años necesiten más de una dosis. Hable con el proveedor de atención médica de su hijo para averiguar si necesita más de una dosis. Se recomiendan dos dosis aplicadas con cuatro semanas de diferencia como mínimo en el caso de los niños que tienen entre 6 meses y 8 años de edad a los que se les aplica la vacuna antigripal por primera vez y en el caso de otros niños de este grupo de edad.

<sup>2</sup> Tanto los niños como las niñas deben recibir 3 dosis de la vacuna contra el VPH para protegerse contra la enfermedad relacionada con el VPH. La vacuna contra el VPH puede empezar a aplicarse a partir de los 9 años de edad.

<sup>3</sup> Se necesitan dos dosis de la vacuna contra la hepatitis A para lograr una protección a largo plazo. La primera dosis de la vacuna contra la hepatitis A se debe administrar entre los 12 meses y los 23 meses de edad. La segunda dosis se debe administrar entre 6 y 18 meses después. La vacuna contra la hepatitis A se puede aplicar a cualquier niño que tenga 12 meses o más para protegerlo contra la hepatitis A. Los niños y adolescentes que no recibieron la vacuna contra la hepatitis A y que tienen un riesgo alto deben recibir la vacuna contra la hepatitis A.

<sup>4</sup> Todos los niños y niñas de 11 y 12 años de edad deben vacunarse con una única dosis de la vacuna antimeningocócica conjugada cuadrivalente (MenACWY). Se recomienda una vacuna de refuerzo a los 16 años de edad.